

P D E 5 阻害薬を服薬される皆様へ

以下の注意事項を必ずお守りください。

- ◎本剤は勃起機能を改善する薬です。
- ◎性行為の約1時間前を目安にお飲み下さい。
- ◎1日1回の服薬とし、次の服用は必ず24時間以上あけて下さい。
- ◎服用される時はパートナーに知らせておきましょう。
- ◎他人には絶対に譲り渡さないで下さい。
- ◎硝酸剤(ニトログリセリ)などの飲み薬、舌下錠、貼り薬、吸入薬、注射、塗り薬、スプレーを使用している方は本剤を絶対に服用しないで下さい。

《PDE5阻害薬一覧》

商品名	バイアグラ	レビトラ	シアリス
一般名	シルデナフィル	バルデナフィル	タダラフィル
剤型	25・50mg	5・10・20mg	5・10・20mg
効果持続時間	30分～4時間	4～5時間	36時間
効果発現	30分～60分	10分～30分	60分
食事の影響	吸収・効果発現の遅延	高脂肪食で効果減弱	なし
副作用発現率	頭痛(12.7%) 顔のほてり(10.2%) 視覚障害(1.9%)	顔のほてり(20.6%) 頭痛(7.4%) 鼻炎(4.4%)	頭痛(11.3%) 顔が赤くなる(5.1%) 顔のほてり(3.5%)

